

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

Rosa de Bohemia

Tamaño: Medio a pequeño.

Forma: Esfero irregular y generalmente aplastada por los dos polos. Contorno asimétrico, a veces elíptico.

Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda. **Pedúnculo:** Partido.

Cavidad del ojo: Mas bien de anchura media, poco profunda pero delimitada. **Ojo:** Cerrado o entreabierto. Sépalos pequeños, erectos o vueltos hacia fuera.

Piel: Levemente grasa. **Color:** Verde claro. Chapa en zona de insolación un poco ruborosa a la vez que, sobre la misma, pinceladas pequeñas de tono más fuerte. Punteado abundante, más denso en la zona del ojo, entremezclado de color blanco y ruginoso.

Tubo del cáliz: Mediano, alargado o en forma de embudo que se comunica con el corazón. Estambres insertos en su mitad.

Corazón: Centrado. Eje abierto. Celdas arriñonadas, cartilaginosas y de color muy claro.

Semillas: Pequeñas y de color claro.

Carne: Blanca con algún punto verdoso. Tierna, semi-jugosa. **Sabor:** Aceptable.

Maduración: Verano.

